

“ ज्ञानाची शेती ”

विषमुक्त (Residue Free) मेथी लागवड तंत्रज्ञान

श्री. अंकुश बरडे, एम.एस.सी. (कृषी)

प्रस्तावना :-

मेथी हे पिक मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात येणारे पालेभाजी तथा मसाला पिक असून आपल्या भारत मेथी पिकाखाली जवळपास 1.5 लाख हेक्टर ऐवढे क्षेत्रावर लागवड करण्यात येते. भारतामध्ये प्रामुख्याने राजस्थान, गुजरात, पंजाब या राज्यांमध्ये मेथीची लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते, त्याखालोखाल महाराष्ट्र राज्यात मेथीची लागवड केली जाते. महाराष्ट्रामध्ये पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, नागपूर, सोलापूर व शहरांच्या जवळपास परिसरातील शेतकरी मेथी पिकांची लागवड करत असतात. हे एक अल्प कालावधीमध्ये तयार होणारे भाजीपाला पीक असून त्याची लागवड ताजी भाजी आणि मेथी बियाणे यासाठी केली जाते. कमी खर्चात, कमी कालावधीमध्ये व कमी कष्टात मेथी पिकातून शेतकऱ्याला चांगला नफा आणि बाजारभावाने साथ दिल्यास लखपती बनवू शकते.

मेथीची ताजी हिरवी पाने भाजीसाठी वापरली जातात. मेथीच्या बियांचा मसाल्यामध्ये उपयोग होतो. तसेच लोणचे करण्यासाठी मेथी बियांचा उपयोग होतो. मेथी मध्ये औषधी गुणधर्म आहेत. मेथीमध्ये पचनक्रिया सुधारण्याचे औषधी गुणधर्म असून, प्रथिने, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, लोह व जीवनसत्व “अ” आणि “क” भरपूर प्रमाणात असतात. मेथीची भाजी ही जास्त प्रमाणात ताज्या स्वरूपात सेवन करत असल्याने या पिकाचे विषमुक्त (Residue Free) उत्पादन घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यासाठी आज आपण रसायन मुक्त मेथी लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञानाची माहिती घेणार आहोत.



हवामान व लागवडीचा हंगाम:-

मेथीसाठी उष्णकटिबंधीय व समशीतोष्ण हवामान मानवते. 10°C पेक्षा कमी व 36°C पेक्षा जास्त चे तापमान मेथी पिकास मानवत नाही. मेथी पिकाचे आपल्याकडे खरिप व रब्बी हंगामामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. खरीप हंगामात (पावसाळ्यात) पाऊस जास्त झाला तर पिकांचे नुकसान होते तर उन्हाळी हंगामात मेथीसाठी हमखास पाण्याची आवश्यकता असते. उन्हाळ्यात या पिकांची वाढ चांगली होत नाही, पिक तयार होण्यासाठी जास्त दिवस लागतात, उत्पादन कमी मिळते परंतु उन्हाळ्यात बाजारात मेथीचे चांगले दर असल्यामुळे त्यातून शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्न मिळते.

मेथी पिकाची लागवड ही मे - जून मध्ये केल्यास मोठ्या पावसापासून पिक वाचवता येते तसेच थंडी सुरू होण्यापूर्वी मेथीची लागवड केल्यास मेथी पिकास चांगला बाजारभाव मिळतो. कमी पावसाचे प्रदेशात जुलै - ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये हलक्या जमिनीवर या पिकाची लागवड केल्यास चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता असते त्यामुळे धाराशिव, लातूर जिल्ह्यामध्ये जुलै - ऑगस्ट या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात लागवडी होतात. अति थंडी, अति पाऊस, जास्त तापमानाचा कालावधी वगळून वर्षभर या पिकाची लागवड करता येते.

जमिनीची मशागत, रान बांधणी व एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन :-

मेथी या पिकांची लागवड पावसाळी हंगामात करावयाची असेल तर हलकी ते मध्यम जमीन निवडावी. रब्बी व रब्बी हंगामात लागवडीसाठी भारी, काळी कसदार जमीन निवडावी. मेथीची लागवड सर्व प्रकारच्या जमिनीत करता येते, परंतु उत्कृष्ट निचऱ्याची जमीन आवश्यक असते तसेच चूनखडीयुक्त जमिनीत मेथीची लागवड करू नये.

मोठ्या शहरांच्या जवळपास परिसरातील शेतकरी मेथी, कोथिंबीर, शेंपू, माठ, पालक, कोबी, फ्लावर इत्यादी प्रकारच्या कमी कालावधीमध्ये तयार होणाऱ्या पिकांची लागवड त्यांच्याकडिल अल्प प्रमाणात असलेल्या शेतीमध्ये वर्षभर करत असतात. अशा परिसरामध्ये मजुरांची उपलब्धता कमी असते तसेच मजुरीचा दरही जास्त असतो. या भागातील शेतकऱ्यांनी पिक लागवडीसाठी सगुना रिजनरेटिव्ह तंत्रज्ञानाचा (SRT) चा वापर केल्यास थोड्याशा क्षेत्रामधून, नियमितपणे व कमी उत्पादन खर्चातून चांगले उत्पन्न होऊ शकते.



सगुना रिजनरेटिव्ह तंत्रज्ञान (SRT) मध्ये उन्हाळ्यात जमिनीची नांगरट करून कुळवाच्या पाळ्या देऊन रान भुसभुशीत करून घ्यावे. आपल्याकडील उपलब्धते प्रमाणे शेणखत / कंपोस्ट खत शेवटच्या पाळीच्या अगोदर देऊन मातीत चांगले मिसळावे त्याच वेळेस संयुक्त रासायनिक खत 10:26:26, 12:32:16, 20:20:00:13 24:24:00:08, 18:46 या पैकी कोणतेही खत 100-200 किलोग्रॅम व सिंगल सुपर फॉस्फेट पावडर 200 किलो स्वरूपातील मातीत चांगले मिसळून घ्यावे व जमिनीची आखणी करून 4-5 फुटांचे बेड सोडावेत. दोन बेड मधील अंतर एक ते दिड फुट ठेवावे. बेडची उंची 0.5 ते 1 फुट ठेवावी. या बेडवर दोन 16/18 एम.एम.च्या दोन इनलाईन लॅटरल, (30 से.मी. ड्रीपर) अंथरून घ्याव्यात. ड्रीपर चा डिस्चार्ज 1-2 लिटर प्रति तास असावा. प्लास्टिक मल्विंग करावयाचे असेल तर ते अंथरून घ्यावे. प्लास्टिक मल्विंग हे 50 मायक्रॉन जाडीचे घ्यावे. कारण याच बेडवर आपण वर्षभरात 3 पिके घेणार आहोत.

हे बेड पहिल्या वर्षी केले तर नंतर मोडायचे नाहीत. या बेडवर सुरुवातीचे पिकाची काढणी झाल्यावर बेड ची डागडुजी करून पहिल्या पिकाचे उगवणारे फूटवे बिन निवडक तणनाशकाने मारावयाचे व पुन्हा त्याच बेडवर 8-10 दिवसांनी पुढील पिकाची टोकण किंवा पुर्नलागवड करावयाची असे पुढील पिकाची काढणी / कापणी करावयाची व बिन निवडक तणनाशक मारावयाचे व पुन्हा तिसऱ्या पिकाची लागवड करावयाची हे असेच निरंतरपणे कोणतीही मशागत न करता सुरू ठेवायचे. नंतरचे वर्षी प्लास्टिक मल्विंग पेपरची आवश्यकता पडत नाही. कारण वर्षभरात घेतलेल्या तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त कमी कालावधीच्या पिकांमधून मिळणारे पिकांचे अवशेष प्रमाणात बेडवर व दोन बेडवरील जागेवर टाकल्यास जैविक आच्छादन तयार होणार आहे. याप्रमाणे पुढे कायमस्वरूपी हे बेड तसेच ठेवून आपणास वर्षानुवर्षे लागवड करता येणार आहे. त्यामुळे मातीचा सेंद्रिय कर्ब वाढून जमिनीतील सूक्ष्मजीवांचे (बुरशी, जिवाणू, मायकोरायझा, ऑक्टिनोमायसेटस, प्रोटोझोआ, गांडूळ इत्यादी) वाढ मोठ्या प्रमाणात होऊन जमिनीची सुपीकता वाढते व दरवर्षी द्यावयाचे खताचे प्रमाण कमी करून अथवा बंद करून आपणास उत्पादन घेता येईल. सगुना रिजनरेटिव्ह तंत्रज्ञान (SRT) बाबत सखोल माहिती घ्यावी व विना नांगरण, विना मशागती या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा ज्यामुळे उत्पादन खर्चात खूप मोठी बचत होते.

बियाणे प्रमाण, बीज प्रक्रिया व लागवडीचे अंतर:-

मेथी पिकाचे एक एकर लागवडीसाठी खरिप व उन्हाळी हंगामात 30 किलो बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. बियाण्याची गुणवत्ता व हंगामानुसार एकरी बियाण्याचे प्रमाण बदलू शकते. पेरणीपूर्वी बियाणास ट्रायकोडर्मा, स्फुरद विरघळवणारे जिवाणू (पीएसबी), पालाश उपलब्ध करून देणारे जिवाणू (केएमबी) व रायझोबियमची प्रति किलो बियाण्यास 5 ग्रॅम प्रत्येकी याप्रमाणे लागवडीचे दिवशी सकाळी थोड्याशा गुळाच्या पाण्यासोबत घेऊन बिज प्रक्रिया करून सावलीत बियाणे सुकवून लगेच पेरणी करावी.

मेथी पिकाची पेरणी शेतकरी लहान ट्रॅक्टरने किंवा हाताने विस्कटून (फोकुन) किंवा आंतरपीक पिक पद्धतीमध्ये टोकण करत असतात. मेथीची लागवड बी पेरूनच करावी ज्यामुळे आंतरमशागत, खुरपणी करता येते, दोन रोपांमधील व दोन ओळींमध्ये अंतर समान राखल्याने पिकाची एक सारखी वाढ होते, उच्च दर्जाचे उत्पादन मिळते, पेरणीसाठी बियाण्याचे प्रमाण कमी करता येते आणि पेरणी केलेल्या मेथीच्या 2/3 कापण्या करता येतात. पेरणी 30 सेमी x 5 सेमी अंतरावर करावी ज्याचेसाठी बाजारात वेगवेगळ्या उत्पादकांची हस्तचलित तसेच ट्रॅक्टरचलित यंत्रे उपलब्ध आहेत त्यांचा वापर करावा.

मेथीचे प्रचलित वाण:-

मेथी या पालेभाजी पिकाचे वाण कसुरी मेथी व स्थानिक (गावरान) मेथी या दोन मुख्य प्रकारांमध्ये बाजारात उपलब्ध आहेत.

कसुरी मेथी :-

कसुरी मेथीची पाने लहान, गोलाकार असून या प्रकारची मेथी सुरुवातीस सावकाश वाढते. ही मेथी बुटकी, झुडुप प्रकारातील आहे. त्यांच्या फांद्या व देठ लहान असतात. ही अधिक सुगंधी, स्वादिष्ट व रुचकर असते.



गावरान (स्थानिक) मेथी :-

वेगवेगळ्या प्रदेशात स्थानिक निवड पद्धतीने शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील बियाणे जतन केलेले आहे व त्या-त्या प्रदेशात पिकणाऱ्या, बाजारात मागणी असणाऱ्या बियाणास गावरान (स्थानिक) मेथी वाण म्हणतात. या प्रकारातील मेथीची पाने मोठी असतात, भरपूर फांद्या येतात. उदा. हत्ती, डायमंड, दिपक, डॉलर, अशोकाची लालकोर मेथी ई.

आपल्याकडील बाजारात ज्या वाणास मागणी आहे त्याचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांनी वाणाची निवड करावी. काही सुधारीत व शेतकऱ्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या असलेल्या वाणाची माहिती खाली दिलेली आहे.

1) कसुरी सिलेक्शन :-

ही सुधारित जात असून तयार होण्यास 60 दिवस लागतात, उंची साधारणपणे 40-80 सेंटीमीटर, 15-30 दिवसांनंतर दुसरी कापणी केली जाऊ शकते, एकूण 3 कापण्या होतात, उशीरा तयार होणारा वाण.

2) पुसा अर्ली बॅचिंग :-

उंची-साधारणपणे 30-60 सेंटीमीटर, पाने - गडद हिरवी, नाजूक आणि सुगंधी, आकार- इतर जातींच्या तुलनेत पाने मोठी, पहिली कापणी - 30-45 दिवसा नंतर, हंगामात 2-3 वेळा कापण्या, 15-20 दिवसांनी पुढील कापणी करता येते, ह्या वाणाची मेथी लवकर फुलावर येत नाही.

3) फुले कस्तुरी :-

उंची-साधारणपणे 30-60 सेंटीमीटर, पाने- गडद हिरवी, नाजूक आणि सुगंधी, पहिली कापणी - पेरणीनंतर 30-45 दिवसांनी पुढील कापणी 15-20 दिवसांनी, वाढीच्या हंगामात 2-3 वेळा कापण्या करता येतात या वाणास भरपूर फुटवे येतात, जास्त उत्पादनक्षम वाण, मर व नागअळीस प्रतिकारक्षम वाण.

4) बॉम्बे सुपर :-

उंची- 30-60 सेंटीमीटर, पाने- मोठी, गोल, गडद हिरवी, नाजूक आणि सुगंधी, पहिली कापणी पेरणीनंतर 40-50 दिवसांनी, प्रत्येक 15-20 दिवसांनी पुढील कापणी करता येते. एकरी 40-42 किलो बियाणे आवश्यक.

5) डॉलर मेथी :-

पाने- गडद हिरवी, नाजूक आणि सुगंधी, इतर जातींच्या तुलनेत मोठी आणि अधिक लुसलुशीत असतात, 2-3 वेळा कापण्या करता येतात, पहिली कापणी पेरणीनंतर 30-45 दिवसांनी, 15-20 दिवसांनी पुढील कापण्या करता येतात .

6) दिपक :-

पाने- गडद हिरवी, नाजूक आणि सुगंधी, मोठी आणि अधिक रसाळ असतात, पहिली कापणी 30-45 दिवसात होते, हंगामात 2-3 वेळा कापण्या, 15-20 दिवसांनी पुढील कापणी करता येते, उन्हाळी हंगामासाठी शिफारस, उच्च उत्पादन क्षम, बाजारात या मेथीस जास्त मागणी आहे.

7) अशोका लालकोर :-

पाने- गडद हिरवी, नाजूक आणि सुगंधी, मोठी आणि अधिक रसाळ, पहिली कापणी पेरणीनंतर 30-45 दिवसांनी, प्रत्येक 15-20 दिवसांनी पुढील कापणी करता येते. हंगामात 2-3 वेळा कापण्या करता येतात. बाजारात सगळ्यात जास्त बाजारभाव या मेथीला मिळतो, उच्च उत्पादनक्षम वाण परंतु बियाणे थोडेसे महाग आहे.

आंतरमशागत व तणनियंत्रण:-

मेथी पिकासाठी पिक सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये तणविरहीत ठेवावे लागते. मेथीची लागवड कमी अंतरावर असल्याने खूरपणी करता येत नाही. त्यासाठी पेरणी केलेल्या दिवशी उगवणपूर्व तणनाशक ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% EC (गोल) प्रति 15 लिटर पंपासाठी 6-8 मिली पेरणीचे दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी फवारणी करावी. पुन्हा आवश्यकता पडल्यास पिक 10-15 दिवसाचे असताना क्विझॉलफॉप इथाईल (टरगा सुपर) 25 मिली 15 लिटर पंपासाठी प्रमाण घ्यावे त्यामुळे गवत वर्गीय तणांचा बंदोबस्त होतो.

पाणी व्यवस्थापन:-

मेथी हे पीक अल्पकालावधीचे असले तरी त्यास पाण्याची गरज असते. त्यासाठी शेतकरी सारा पद्धत, ठिबक, मायक्रो स्प्रींकलर, रेन पाईपचा वापर करतात . SRT पद्धतीने बेड तयार करून लागवड करावयाची असेल तर ठिबक किंवा मायक्रो स्प्रींकलर तसेच रेन पाईपचा वापर करून उत्कृष्ट पाणी व्यवस्थापन करता येते. सारा (पाट) पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन करणे ही एक कालबाह्य झालेली पारंपारीक पद्धत आहे त्याचा वापर करू नये. सुधारित पाणी देण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करावा ज्यामुळे पाण्याची बचत होते तसेच जमिनीत कायम वाफसा स्थिती राखता येत असल्याने उच्च दर्जाचे उत्पादन मिळते. उन्हाळी हंगामामध्ये रेन पाईप व सूक्ष्म तुषार (Micro Sprinkler) पद्धतीने पाणी व्यवस्थापन करणे दर्जेदार उत्पादनासाठी फायदेशीर ठरते .



एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन:-

मेथी या पिकावर मावा, पाने पोखरणारी अळी (लिफ मायनर) व रस शोषण करणाऱ्या कीटकांचा प्रादुर्भाव होतो तसेच मर, मुळकुज, रोप कोलमडणे, पानावरील ठिपके, केवडा व तांबेरा रोगांचा प्रादुर्भाव होतो.

मर, मुळकुज व रोपे कोलमडणे यासाठी जैविक बिज प्रक्रिया केल्यास उत्कृष्ट पद्धतीने नियंत्रण होते. तसेच मेथी पिकावर येणाऱ्या मररोग, मूळकूज, रोपे कोलमडणे या रोगांचे बंदोबस्तासाठी मेटारायझम अॅनोसोप्ली, ट्रायकोडर्मा व्हीरीडी, ट्रायकोडर्मा हारजिनियम, पॅसिलोमायसिस व सुडोमानास फ्लुरोसन्स प्रति एकर एक किलो/ लिटर याप्रमाणे ठिबक मधून किंवा पाण्याच्या अगोदर सायंकाळी जमिनीवर विस्कटून दिल्यास व तात्काळ पाणी दिल्यास या जैविक बुरशीची वाढ चांगली होते व जमिनीतील रोगकारक बुरशीचा चांगल्या प्रकारे बंदोबस्त होतो.

रस शोषण करणाऱ्या किडीसाठीचे बंदोबस्तासाठी बिव्हेरिया बॅसियाना, नोमुरिया रिलाई, लेक्नीसिलीएम लेक्नानी, लॅक्टोबिलस, बॅसिलस थुरेंजिनिसिस व बॅसिलस सबटिलिस या जैविक बुरशीनाशकाचा वापर प्रति लिटर पाण्यासाठी 5 मिली या प्रमाणात घेवून ही फवारणी सायंकाळी पाच वाजेनंतर घेतल्यास मावा, विविध प्रकारच्या अळ्यांचे उत्कृष्ट पद्धतीने नियंत्रण होते. वरील प्रमाणे बिज प्रक्रिया व आळवणी केल्यास किडी तसेच रोग नियंत्रणासाठी रासायनिक किटकनाशकांची आवश्यकता पडत नाही. शेतकऱ्यांनी केवळ रासायनिक किडनाशकावर अवलंबून न राहता एकात्मिक व कीड व रोग नियंत्रण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना कराव्यात

- पिकांची फेरपालट करावी.
- जमिनीची खोल नांगरट करावी.
- पिकाची बेडवर लागवड करावी.
- पेरणीपूर्वी बियाणास बिज प्रक्रिया करावी.
- ठिबक, तुषार व रेन पाईपचा सिंचनासाठी वापर करावा.
- लागवडीसाठी किड व रोग प्रतिकारक वाणांची निवड करावी.
- रस शोषण करणाऱ्या किडीसाठी निळे / पिवळे चिकट सापळे एकरी 40 या प्रमाणे वापरावेत.

- प्रकाश सापळा एकरी 1 या प्रमाणे लावावा.
- एकरी 10 ते 15 पक्षी थांबे करावेत.
- आवश्यकते प्रमाणे पाणी व्यवस्थापन करावे शेतात पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- नत्रयुक्त खते शिफारशी प्रमाणे द्यावीत.
- 5% निंबोळी अर्काची प्रतिबंधात्मक फवारणी करावी.

रासायनिक पद्धतीने किड नियंत्रण करण्यासाठी सोबतचे प्रपत्रात नमूद केलेप्रमाणे किडींनी आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडल्यानंतर, शिफारशी प्रमाणे सकाळी नऊच्या आत व सायंकाळी चार नंतर फवारणी घ्यावी. फवारणीचे द्रावणात स्टिकर वापरावे. तापमान जास्त असल्यास भर उन्हात फवारणी करू नये त्यामुळे पानावर डाग पडून उत्पादनाचा दर्जा खालावतो.

काढणी उत्पादन व विक्री व्यवस्थापन:-

मेथी सारख्या अल्प कालावधीमध्ये येणाऱ्या पिकाची लागवड टप्प्याटप्प्याने करावी म्हणजे एक एकर क्षेत्रावर लागवड करावयाची असेल तर 10 गुंठे क्षेत्रावर प्रथम लागवड त्यानंतर 10 दिवसांनी दुसरा प्लॉट असे टप्प्याटप्प्याने पुढील क्षेत्रामध्ये लागवड करावी ज्यामुळे बाजारभावातील चढउताराचा फायदा मिळू शकतो. तसेच मजूर टंचाईवरही काही प्रमाणात मात करता येते.

मेथी पिकाची काढणी अथवा पहिली कापणी 30-35 दिवसात करावी, जास्त कालावधीसाठी पिक जर शेतात ठेवले तर त्यास फुले लागतात. त्यामुळे मेथी काढणीस तयार झाली की तात्काळ मेथीची कापणी करून स्वच्छ करून त्यांचे पेंढ्या बांधून प्लास्टिक क्रेटमध्ये बाजारात पाठवावी. काढणी शक्यतो सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी करावी. सकाळी काढणी केल्याबरोबर लगेच मेथी बाजारात विक्रीसाठी पाठवावी आणि सायंकाळी काढणी केलीली मेथी दुसऱ्या दिवशी बाजारात पाठवावी.

निवडलेला वाण, जमिनीचा प्रकार, लागवडीचा हंगाम व शेतकऱ्यानी एकंदरीत केलेले पीक व्यवस्थापन यावर मेथीचे उत्पादन अवलंबून असते सरासरी मेथीचे एकरी 8 ते 10 टन उत्पादन मिळते.



जास्त पावसाच्या प्रदेशात व उन्हाळ्यात मेथीची लागवड करताना घ्यावयाची काळजी:-

जास्त पावसाच्या प्रदेशात 25 मे नंतर वातावरणात बदल झाल्यावर म्हणजेच रोहिणी नक्षत्र निघाल्यावर मे - जुन मध्ये हलक्या ते मध्यम उताराच्या जमिनीमध्ये मेथीची पेरणी केल्यास जुलै - ऑगस्टमध्ये मेथीचे पीक काढणीस येते. त्यास चांगला बाजार भाव मिळण्याची शक्यता असते.

उन्हाळ्यात मेथीची लागवड करावयाची असल्यास मेथीचे शेताचे कडेने मका / नेपियर गवताची लागवड करावी मक्याचे बी लागवडी पूर्वी बेडच्या कडेने संपूर्ण क्षेत्रावर लावले तर जास्त तापमानामुळे होणारे मेथीचे नुकसान होत नाही. उन्हाळी हंगामामध्ये जमीन प्रथम भिजवून (ओलवून) वाफश्यावर बियाणे पेरावे व नंतर तीन दिवसांनी पुन्हा जमीनीस ओलीत करावे. उन्हाळी हंगामासाठी भारी, काळी, कसदार जमीन मेथी लागवडीसाठी निवडावी.

मेथी या पिकासाठी केंद्रिय किटकनाशक मंडळ आणि नोंदणीकृत समिती (CIBRC) व कृषि विद्यापीठ यांच्या फारश्या शिफारशी नाहीत परंतु शेतकरी खाली नमूद केलेली किडनाशके / बुरशीनाशके वापरतात.

अ.क्र.	किडीचे नाव / नुकसानीचा प्रकार	किटकनाशक बुरशीनाशकाचे नाव व गट	उत्पादकाचे नाव व ब्रँड नेम	एकरी प्रमाण	काढणीपश्चात कालावधी
1	मावा, पांढरी माशी, फुलकिडे, लिफहॉपर्स	इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL (नियोनीकोटीनॉईड ग्रुप)	बायर - कॉन्फीडॉर	20-40	7-14
2	फुलकिडे, मावा, पांढरी माशी, फुलकिडे, लिफहॉपर्स, अब्ब्या	स्पिनोसॅड 45% SC (न्युरोटॉक्सीन)	कॉरटेक्हा - ट्रेसर	40-60	3-7
3	स्पोडोप्टेरा अळी, मावा, फुलकिडे, लिफहॉपर्स व सुत्रकृमी	थायोमीथाॅक्झाम 25% WG (कार्बामेट)	सिंजेंटा - अक्टरा	20-40	7-14
4	केवडा, भुरी, पानावरील ठिपके व इतर बुरशी	मॅन्कोझेब 75% WP	युपीएल - एम -45	500	7-14
5	मावा, पांढरी माशी, फुलकिडे, लिफहॉपर्स	डायमिथोएट (ऑर्गॅनोफॉस्फेट)	FMC - रोगर	120-200	14
6	केवडा, भुरी, पानावरील ठिपके व इतर बुरशी	क्लोरोथॅलोनिल 75% WP	सिंजेंटा - कवच	400	7-14
7	भुरी, केवडा, करपा, अँथ्रॅक्रोझ	अँझोक्सिस्ट्रॉबिन 23% SC	सिंजेंटा - अमीस्टार	80	7
8	भुरी, पानावरील ठिपके, केवडा	टेब्युकोनॅझोल 25% EC	बायर - फॉलीक्युअर	20	7-10
9	भुरी, पानावरील ठिपके, केवडा	प्रोपीकोनॅझोल 25% EC	सिंजेन्टा - टिल्ट	20	7-14
10	केवडा, उशिरा येणारा करपा, तांबेरा	बोर्डो मिश्रण 1 %	-	-	-
11	केवडा, उशिरा येणारा करपा, तांबे	कॉपर हायड्रॉक्साईड 53.8 % W/W DF	BASF - कोसाईड	200	-

फायद्याची व आरोग्यदायी..!